



AECHMEA (*Aechmea fasciata*)

Familia: Bromeliáceas.

Origen: Brasil.

Variedades: "Morgana", "Romero".

Cuidados: Se desarrolla bien en lugares bien luminosos, hasta soportan pequeños periodos de sol directo. Presenta una inflorescencia que lleva un racimo de brácteas de color rosado en la cual se instalan las flores de color azul pálido. Las brácteas duran varios meses, y luego empiezan a aparecer brotes nuevos en la base de la planta. Regar moderadamente sobre el sustrato, solamente en verano es recomendable regar en el centro de la planta. (manteniendo limpia el agua). Es conveniente abonarla con fertilizante diluido (NPK 15-15-15) a 2 gr./lt. de agua, en primavera-verano.

Al ser plantas epifitas, tienen el sistema radicular poco desarrollado por lo que no necesitan macetas grandes.



AGLAONEMA (*Aglaonema commutatum*)

Familia: Aráceas.

Origen: Indonesia y Sureste Asiático.

Variedades: Las más utilizadas en nuestro país son "Silver Queen" y "Pseudobracteatum". Las más modernas de hojas grandes "Freedman" y "King of Siam".

Cuidados: Es la planta por excelencia para los lugares sombríos de la casa. Riego moderado, mantenerla húmeda en primavera y verano pero sin exceso, en invierno riegos más esporádicos, dejando secar la tierra entre ellos.

En primavera es conveniente abonarla con fertilizantes comerciales (NPK 15-15-15) a razón de 2 gramos por litro de agua. Rociar con regularidad, en verano y en ambientes muy calefaccionados.

Transplantar las plantas cada dos años. Los problemas sanitarios más

comunes es el ataque de cochinillas, combatirlas con insecticidas

comerciales específicos. (Lorsban, Applaud, etc.)



ALEGRIA (*Impatiens* "Nueva Guinea")

Familia: Balsamináceas.

Origen: Trópicos de Asia y África.

Variedades: "Cosmos", "Red planet", "Pulsar", "Indians", "Presto".

Cuidados: La Alegría de "Nueva Guinea" son híbridos de las diversas especies originarias de aquellas zonas. Se utilizan en exterior a la sombra o como plantas de interior en lugares bien iluminados. Es necesario evitar que las plantas se sequen, vigilando estrictamente el riego, mantener bastante húmedo especialmente en verano. Una leve falta de agua la planta la manifiesta con decaimiento de las hojas. Evitar mojar las flores. Si las condiciones de humedad son muy elevadas combinado con frío, puede aparecer un hongo a nivel de flor llamado botrytis que se controla con Benomyl. Su floración se da en otoño, primavera y verano.



ANTURIO (*Anthurium scherzerianum*)

Familia: Aráceas.

Origen: América Central.

Variedades: *Anthurium Andreanum* variedades híbridas; Rojos: "Claudia", "Cora", "Leny", "Laura", "Mylène". Rosados: "Elisabeth", "Pink Champion". Blancos: "Desirée", "Champion"

Cuidados: Crecen bien en ambientes cálidos, con buena iluminación, pero sin exposición directa al sol. Las flores duran varias semanas y se consiguen plantas en flor todo el año. Riegos generosos en verano y restringidos en invierno, rociar el follaje en verano y en ambientes muy cálidos y secos. Fertilizar en primavera - verano con fertilizante comercial que contenga micro elementos. (NPK + B, Cu, Fe, Mn, Mo, S, Zn). En ambientes muy secos es posible la aparición de ácaros (arañuela roja) que se combate eficazmente con productos específicos. (Vertimec, Acaristop, o similar.)



APHELANDRA (*Aphelandra squarrosa*)

Familia: Acantáceas.

Origen: Bosques tropicales del centro y sur de América.

Variedades: "Fritz Prinsler", "Ivo", Silver Queen", "Louisae", "Dania".

Cuidados: Ubicarla en sitios luminosos, los rayos directos del sol la perjudican, pero la falta de luz en invierno frena el crecimiento y la formación de flores. Estas van del rojo al amarillo, insertadas en brácteas amarillas cuya duración es de aproximadamente seis semanas. Cuando la floración termine es recomendable quitar la inflorescencia. Regar generosamente en verano y moderadamente cuando comience a descender la temperatura, también en verano es conveniente pulverizar frecuentemente. Tanto la escasez de agua como el exceso provocan la caída de las hojas. Abonarla en primavera verano con 2gr./lt. de agua de fertilizante comercial (NPK 15-15-15).



ARECA (*Dypsis lutescens*)

Familia: Palmae.

Origen: Madagascar.

Cuidados: De las palmeras más elegantes para interiores. Necesita buena luz, sin exposición a sol directo. Ubicarla en sitios templados, son sensibles a fríos y a cambios bruscos de temperatura y humedad. Regarlas moderadamente en invierno, un poco más abundante en verano, siempre dejando secar el sustrato entre los riegos. Es aconsejable rociarla en verano, y en ambientes muy calefaccionados. De aparecer manchas amarillas en las hojas pulverizar con un fungicida (Benlate, sumisclex o similar).

Fertilizar en primavera - verano con triple 15-15-15, a razón de 2 gr/lit. de agua.

VIVERO
MUSACCO



ASPLENIUM (*Asplenium nidus*)

Familia: Aspleniáceas.

Origen: Zonas tropicales de Africa oriental, Asia y Australia.

Variedades: "Daucifolium" y "Bulbiferum"

Cuidados: Conocido como helecho nido de ave, es una planta que debe situarse en ambientes templados con buena luz, sin exposición al sol directo. No soporta ambientes muy secos, ni oscilaciones bruscas de temperatura y humedad. Riegos moderados en invierno, más frecuentes en verano, siempre sobre el sustrato. Pulverizaciones solo recomendables en verano, tener en cuenta que las hojas estén seca al llegar la noche, como manera de prevenir manchas.

La combinación de frío, con exceso de humedad, puede causar daños a nivel de raíz, que luego se manifiestan en las hojas.

Fertilizarla cada primavera con fertilizante comercial, (NPK 15-15-15) a una dosis de 1 gr./lt. de agua. De aparecer insectos aplicar Lannate (metomilo) a la menor dosis según prospecto.



AUCUBA (*Aucuba japonica*)

Familia: Cornáceas.

Origen: Bosques sub tropicales del Himalaya y Asia Oriental.

Variedades: "Variegata", "Longifolia" y "Crotonifolia".

Cuidados: Se la puede utilizar en exteriores en semisombra, o en interiores frescos, sin calefacción y buena luz. No exponer al sol directo, ya que este daña las hojas. Regar frecuentemente en verano y poco en invierno dejando secar siempre el sustrato entre los diferentes riegos. Abonarla una sola vez en época de crecimiento con fertilizante granulado (NPK 15-15-15) 5grs. por maceta (diámetro 24 cm.) o 10grs. en la base de la planta si esta en tierra.

Las semillas se encuentran en unas bayas de color rojo muy decorativas.

Las puntas de las hojas pueden secarse si el ambiente es excesivamente seco.



AZALEA (*Rhododendron simsii*)

Familia: Ericáceas

Origen: China.

Variedades: "Jozef Heursel", "Avenir", "Aline", "Terra Nova", "Knut Erwin", "Ostallet", "Ilona", entre miles de híbridos.

Cuidados: Las azaleas se pueden utilizar en exterior a la sombra y semisombra o tenerla en interior bien iluminado para disfrutar su floración.

Luego de esta es conveniente plantarla en tierra o en una maceta de mayor tamaño utilizando turba como sustrato. Regar abundantemente, nunca le debe faltar agua, mantener el sustrato húmedo. Es recomendable dejar el agua del plato después del riego para mantenerla húmeda, menos en invierno. Las variedades comercializadas florecen dos veces al año, en otoño y primavera, pero se consiguen plantas en flor todo el año. Una vez finalizada la floración quitar las flores secas.

VIVERO
MUSACCO



BEGONIA (*Begonia rex*)

Familia: Begoniáceas.

Origen: Trópicos de Asia, África y América.

Cuidados: El colorido de las hojas puede variar de verde plateado a púrpura casi negro y pasando por una gran gama de rojos. Necesitan buena luz pero no muy fuerte, ya que puede quemar las hojas. Riegos moderados dejando secar entre los distintos riegos, evitar excesos de agua. Mantener alta la humedad alrededor del follaje en primavera verano, reduciéndola en invierno ya que alta humedad y frío provocan la aparición de hongos.

Como los rizomas tienen raíces superficiales es conveniente utilizar macetas poco profundas.

VIVERO
MUSACCO



CALATHEA (*Calathea makoyana*)

Familia: Marantáceas.

Origen: Brasil.

Variedades: "Zebrina", "Lancifolia", "Roseopicta", "Sanderiana".

Cuidados: Las calatheas gustan de buena luz, pero nunca exponerlas al sol directo, una luz filtrada le mantendrá el colorido de las hojas.

Son plantas que requieren una alta temperatura y elevada humedad del aire, en ambientes muy secos pulverizar con frecuencia. Regar con moderación, pero manteniendo cierta humedad en el sustrato, entre riego y riego, evitar encharcamientos. La falta de agua así como la baja humedad le puede causar manchas en el borde de las hojas.

Fertilizarla en primavera - verano con abonos comerciales para plantas en macetas.

VIVERO
MUSACCO



CHAMADOREA (*Chamadorea elegans*)

Familia: Palmae.

Origen: Méjico y Centro América.

Variedades: "Elegans" es la más utilizada, también se encuentran "Costarricense" y "Zeiffrizzi".

Cuidados: Necesita buena luz, pero tamizada, soporta un poco de sombra. Riegos semanales en invierno, dejando secar la tierra entre los mismos. En verano mantenerla más húmeda, pero no en exceso. En época de crecimiento primavera verano abonarla una vez con fertilizante (NPK) a razón de 2 gr./litro de agua. No tolera temperaturas menores a 13 °C, por lo que no se puede utilizar en exteriores. Florece todos los años, su inflorescencia amarillo anaranjada es muy llamativa. Cuando el aire este muy seco pulverice regularmente el follaje para desalentar el ataque de arañas rojas. Si ya han aparecido las hojas se amarillean, pulverice con insecticidas-acaricidas (vertimec, acaristop o similar).



COLUMNNEA (*Nematanthus wettsteinii*)

Familia: Gesneriáceas.

Origen: Trópicos de América Central y del Sur.

Variedades: "Tropicana", "Gold Spice", Red Line".

Cuidados: Planta colgante, para sitios con buena luz solar sin exposición directa al sol. No prosperan en ambientes muy secos, dado que pierden hojas por lo que es necesario pulverizarlos en estas condiciones. Regarla moderadamente en invierno, y un poco más generoso en primavera verano, siempre dejando secar el sustrato entre los distintos riegos. Una vez secas las flores si no se caen naturalmente es conveniente sacarlas. Son sensibles al ataque de ácaros principalmente en verano, si aparecen aplicar un acaricida comercial.

VIVERO
MUSACCO



CRISANTEMO (*Chrysanthemum morifolium*)

Familia: Compositae.

Origen: Asia Oriental, China y Japón.

Variedades: Todos los cultivares que se encuentran son de origen híbrido, provenientes de *Ch.indicum* y *Ch. Morifolium*.

Cuidados: El crisantemo es muy exigente en luz, colocarlo en un sitio bien luminoso, soportan sol directo. Riegos generosos, mantener el sustrato húmedo, pero no empapado. La falta de agua hace que algunos pimpollos no lleguen a abrirse.

Su período de floración es de seis a ocho semanas, deben ser consideradas como anuales y renovarlas una vez que termino la misma, aunque vuelven a florecer con menos intensidad si se podan. Se consiguen en el mercado plantas en flor todo el año. Se pueden colocar en exteriores, evitando el invierno.



CROTUS (*Codiaeum variegatum*)

Familia: Euforbiáceas.

Origen: Indonesia.

Variedades: "Petra", "Nervia", "Mrs. Iceton" y "Norma", son algunas de las más utilizadas.

Cuidados: Los crotus son muy sensibles a la falta de luz, por lo que deben colocarse en lugares bien iluminados. La coloración de las hojas depende de que la planta tenga buena luz y alta temperatura. Si sufre una carencia de luz demasiado prolongada, las hojas comienzan a caer, al igual que si tiene un exceso o un déficit de agua. Por lo que se aconseja regar moderadamente (semanalmente), dejando secar la tierra entre los distintos riegos. En verano pulverizar el follaje, son susceptibles al ataque de arañas rojas. De aparecer, las plantas pierden coloración por lo que pulverice con insecticidas como Vertimec o similar. Si aparecen cochinillas utilice productos como Applaud u Orthene .



DIEFFENBACHIA (*Dieffenbachia amaoena*)

Familia: Aráceas.

Origen: América Central.

Variedades: "Tropic Snow" como el más popular, "Tropic White", "Camilla", "Janet", "Alix", "Tropic Marianne", "Compacta", "Paco" y "Vesuvius" entre infinidad de híbridos.

Cuidados: Las dieffenbachias necesitan buena luz en invierno, la falta de luz en esta época le debilitan los tallos. En verano un lugar con semisombra, ya que un exceso de luz le puede hacer perder su coloración. No tolera las variaciones de temperatura, ni un descenso prolongado por debajo de 15 ° C. Riegos moderados en verano para mantener húmeda la tierra, dejando secar parcialmente entre un riego y otro. En invierno, conservarla apenas húmeda. Necesita un alto grado de humedad en el aire especialmente en verano. Pulverizar preventivamente contra araña roja con Vertimec, para ataques de cochinillas utilizar productos como Ekalux o Applaud.



DRACAENA (*Dracaena deremensis*)

Familia: Agaváceas.

Origen: Africa y Asia oriental.

Variedades: "Warneckei", "White Stripe", "Yellow Stripe", "Green Stripe", son las más utilizadas en el mercado.

Cuidados: Se comporta muy bien en semisombra, las variedades fluo (verde o amarillo) necesitan lugares más iluminados. Regar moderadamente, dejando secar la tierra entre los distintos riegos. Es conveniente mantener alta la humedad del aire especialmente en verano o en habitaciones muy secas, pulverizándolas.

Las quemaduras en los bordes de las hojas son atribuidas a diversas causas, lo esencial es evitar oscilaciones bruscas de temperatura y humedad. Si aparecen manchas en las hojas, pulverizar con productos como daconil o sumisclex.

Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK) a razón de 2 gr. por litro de agua. Transplantar cada 2 años a un envase de mayor tamaño con tierra preparada para plantas interiores.



ESTRELLA FEDERAL (*Euphorbia pulcherrima*)

Familia: Euforbiáceas.

Origen: Méjico y América Central.

Variedades: "Winterstar", "Diva", "Lady", "Topwhite".

Cuidados: El valor ornamental de esta planta es la llamativa coloración de las brácteas, que mantienen su colorido durante un par de meses. No son flores sino hojas coloreadas, las verdaderas flores son pequeñas de color amarillo e insignificante. Por lo general se comercializan las de color rojo pero también hay de color rosa y blanco.

Ubicarla en sitios con buena luz, sin exposición al sol. Regarla con moderación dejando secar el sustrato entre los distintos riegos.

Se induce la formación de brotes florales en otoño cuando se empiezan a acortar los días, aunque conviene tratarla como una planta de temporada ya que es difícil en el hogar que forme brácteas en la segunda estación.



FICUS (*Ficus benjamina*)

Familia: Moreáceas.

Origen: Zonas tropicales y subtropicales de Europa, Asia y África.

Variedades: de hojas verdes: "Monique", "Daniella", Bushy King" y "Reginald" las más utilizadas. De hojas disciplinadas: "Golden King", "Degantel", "Start Light" y "Hawaii".

Cuidados: Colocar en un sitio con buena luz, puede soportar algunas horas de sol. En sitios muy oscuros las plantas comienzan a desfoliarse por las partes bajas. Se adaptan muy bien en exteriores protegidos, ambientes amplios con corrientes de aire, mientras que no tolera sitios encerrados con calefacción.

Regar moderadamente, dejar secar la tierra entre los distintos riegos siendo estos más generosos en verano. Es recomendable también rociar el follaje en esta época. Abonarla en primavera con fertilizante comercial (NPK 15-15-15) a razón de 2 gr./lt. de agua.

La caída de las hojas se da principalmente por ambientes poco ventilados o por desequilibrios hídricos.



FITTONIA (*Fittonia verschaefeltii*)

Familia: Acantáceas.

Origen: Selvas de Ecuador, Colombia y Perú.

Variedades: de hojas verdes: "argyroneura" y "argyroneura minima" de hoja chica y de hojas rojas: "Pearcei" y "Janita".

Cuidados: Colocar en un lugar iluminado, sin exposición al sol, toleran una sombra moderada.

Deben regarse con frecuencia principalmente en época de crecimiento (primavera - verano) y más distanciados en invierno. Necesitan un alto grado de humedad en el aire por lo que es conveniente pulverizar en verano. No soportan temperaturas inferiores a 15 ° C, pudiendo incluso morir por esta causa. Evitar las corrientes de aire y las variaciones de temperatura.



GERBERA (*Gerbera jamesonii*)

Familia: Compuestas.

Origen: Africa.

Cuidados: La gerbera es un cultivo tradicional para flor cortada, pero últimamente han aparecido en el mercado plantas enanas de gerbera en maceta. Colocarla en lugares bien luminosos, tolerando períodos cortos de exposición al sol. Regarla moderadamente, teniendo mucho cuidado durante la floración de no encharcar la planta. La floración se da en primavera, verano y otoño, pero se consiguen plantas en flor todo el año. Cuando las flores estén desarrolladas y existe una alta humedad ambiente, combinada con ambientes fríos pueden aparecer problemas de hongos (Botrytis), que se controlan con Benomyl.

VIVERO
MUSACCO



HELECHO (*Nephrolepis exaltata*)

Familia: Nephrolepidáceas.

Origen: Regiones tropicales de todo el mundo.

Variedades: "Teddy Junior", "Bostoniensis", "Boston Marathon", "Corditas", "Sonata", son algunos de los más utilizados.

Cuidados: Colocarlos colgados o sobre pedestales en sitios bien luminosos sin sol directo. Regarla frecuentemente en primavera verano, una deficiencia de agua se notara con un amarillamiento y defoliación. En invierno riegos más moderados. Regar siempre sobre el sustrato sin mojar las frondas. Transplantar cuando las raíces cubran totalmente el sustrato o cuando el tamaño de la planta sea desproporcionado con el de la maceta. Abonarlos en primavera con fertilizantes comerciales (NPK 15-15-15 a una dosis de 2 gr./ lt. de agua)



HIBISCO (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Familia: Malváceas.

Origen: Asia Tropical.

Variedades: "Athene", "Ankara" y "Bari" amarillos.
"Bordeaux", "Alicante" y "Barcelona" rojos.

Cuidados: Conocida popularmente como la "Flor de Hawai", los hibiscos comercializados son de porte enano y son ideales para macetas, jardineras, o canteros. Para mantenerlos compactos es importante despuntarlas en invierno para favorecer la ramificación. Deben colocarse en el exterior en sitios donde reciban al menos medio día de sol. Regarlos generosamente en primavera y verano ya que son muy sensibles a la falta de agua, y esto puede provocar la caída tanto de hojas como de pimpollos. En invierno regarlos moderadamente y evitar encharcamientos. Abonarlos con fertilizantes comerciales (NPK + micro elementos) en primavera.

Los problemas más comunes son el ataque de pulgones que se eliminan fácilmente con Lorsban.



HIEDRA (*Hedera helix*)

Familia: Aráliaceas.

Origen: Hemisferio Norte.

Variedades: "Brigitte", de hojas verdes, "Goldchild", amarillas, "Kolibri" marmolada blanca, "Esther" grisacea.

Cuidados: Las variegadas necesitan buena luz, en sombra pierden color y se debilitan, las verdes soportan sitios más oscuros. Ninguna tolera el sol directo. Regar frecuentemente, pero evitar situaciones extremadamente húmedas o muy secas ya que se producen alteraciones irreversibles. Mantener alto el grado de humedad mediante pulverizaciones. Aplicar abonos comerciales en primavera verano (NPK 15-15-15 1gr/lit. de agua), plantas adultas se pueden transplantar también en esta época utilizando tierra preparada para plantas de interior.

VIVERO
MUSACCO



KALANCHOE (*Kalanchoe blossfeldiana*)

Familia: Crasuláceas.

Origen: Madagascar.

Variedades: "Vulcan", "Singapore", "Helgoland", "Fortyniner".

Cuidados: Conocida como la "Flor de la Fortuna", es una planta de gran durabilidad, con flores de colores que van del rojo vivo al amarillo pasando por el rosa. Prefiere sitios bien luminosos, y soleados, aunque también se adapta en semisombra. Hay que tener especial cuidado con el riego ya que requieren poca agua. Regarlas de 2 a 3 veces por semana verano y una sola en invierno. En nuestro país florecen a la salida del invierno, pero se consiguen plantas en flor durante todo el año. La floración dura de dos a tres meses. No presentan prácticamente problemas sanitarios.



KENTIA (*Howea forsteriana*)

Familia: Palmae.

Origen: Isla de Lord Howe, y otras islas del Pacífico.

Variedades: "Forsteriana " y " Belmoreana".

Cuidados: Se comporta muy bien en lugares con luz tamizada o semisombra, las hojas nuevas no soportan sol directo, cuando las plantas son jóvenes. Riegos moderados en invierno, y un poco más generosos en verano, con pulverización de hojas especialmente en ambientes muy secos.

Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK) a razón de 2 gr. por litro de agua. Transplantar cada 2 años a un envase de mayor tamaño con tierra preparada para plantas interiores. De muy lento crecimiento, pero muy resistente al ataque de insectos. De aparecer manchas amarillas en las hojas aplicar benlate o sumisclex.



MARANTA (*Maranta leuconeura*)

Familia: Marantáceas.

Origen: Brasil.

Variedades: "Kerchoveana", "Erythoneura o Tricolor"

Cuidados: Las marantas se pueden colocar en sitios con buena luminosidad, nunca exponerlas al sol, pues decolora las hojas y hasta las puede quemar, si tolera cierta sombra. Son muy exigentes en temperatura, y más que nada en humedad ambiental, por lo que en ambientes con calefacción central pulverizar con frecuencia. En condiciones de ambientes muy secos las hojas se abarquillan hacia arriba. Regarlas frecuentemente en verano y más espaciado en invierno, tratando de evitar que la planta sufra de déficit hídrico, como de encharcamiento del sustrato. Las manchas más comunes que pueden aparecer en las hojas se deben a hongos que se controlan con Diaconil o Dithane.



MARGINATA (*Dracaena marginata*)

Familia: Agaváceas.

Origen: Africa

Variedades: "Tricolor" y "Colorama".

Cuidados: Dracaena marginata tiene hojas verdes con un estrecho borde rojo. Es una de las plantas de interior más resistentes a lugares sombríos y a problemas sanitarios. Regarla con moderación dejando secar el sustrato entre los distintos riegos. En lugares muy oscuros regar más esporádicamente manteniendo la tierra más seca. Es aconsejable rociarla en verano y también abonarla con fertilizante (NPK) a 2 gr/lit. de agua.

Las variedades "Tricolor" y "Colorama" presentan un color crema y rosado entre el verde y se deben colocar en un sitio bien luminosos, incluso soportan períodos con sol directo.

Con respecto al riego las consideraciones son iguales que para la verde. Son plantas que con la edad, el tallo se va desprendiendo de las hojas de la base. Es conveniente pulverizar contra ácaros en la entrada del verano con un insecticida acaricida como preventivo.



PALO DE AGUA (*Dracaena fragrans*)

Familia: Agaváceas.

Origen: Africa.

Variedades: "Massangeana" y "Lindenii".

Cuidados: Se comporta bien en lugares sombríos, en lugares luminosos evitar el sol directo. Riegos moderados, mantener la tierra húmeda en primavera verano y relativamente seca en invierno. No tolera temperaturas inferiores a 10 °C , con lo cual se manchan las hojas con un color ferroso. Es conveniente cortarle la flor cuando florece ya que realiza una detención en el crecimiento. Las quemaduras en puntas y bordes se deben principalmente a oscilaciones bruscas de temperatura y humedad y a excesos de agua de riego.

Abonarla en primavera - verano con fertilizantes comerciales (NPK 15-15-15) a razón de 2 gr. por litro de agua.

En verano pulverizar con un insecticida acaricida como preventivo del ataque de arañas rojas.



PEPEROMIA (*Peperomia obtusifolia*)

Familia: Piperáceas.

Origen: América Tropical.

Variedades: "Variegata", "Green Gold", "Albo-marginata".

Cuidados: Ubicarla en ambientes luminosos, soportan períodos cortos de exposición al sol, sobre todo las variegadas. Se pueden dañar las plantas con temperaturas por debajo de los 10 °C. Es importante también mantener un alto grado de humedad en el aire, mediante pulverizaciones. Riegos moderados dejando secar parcialmente el sustrato entre los distintos riegos, la aparición de hongos y podredumbres de raíces en estas plantas generalmente van asociado a una situación de encharcamiento.

VIVERO
MUSACCO



POUTO (*Epipremnum pinnatum*)

Familia: Aráceas.

Origen: Borneo.

Variedades: "Willcoxii", variegada amarilla, "Marble Queen" variegada blanca.

Cuidados: Colocarla en sitios luminosos, para mantener el colorido de sus hojas, si bien soportan sombra, en esta predominara el color verde. Riegos moderados en invierno, y más generosos en primavera verano evitando encharcamiento. En verano es recomendable asegurar una atmósfera húmeda pulverizando con agua las hojas.

Se puede utilizar tanto como planta colgante así como trepadora. Los daños más frecuentes son causados por hongos y bacterias, lo más típico es el amarillamiento de hojas causados por hongos del suelo lo que se recomienda regarlo con productos como Previcur o Ridomil.



RHAPIS (*Rhapsis Excelsa*)

Familia: Palmae.

Origen: Asia, sur de China.

Variedades: "Excelsa " y " Humilis".

Cuidados: Se comporta muy bien en lugares con luz tamizada o semisombra, las hojas nuevas no soportan sol directo, cuando las plantas son jóvenes. Riegos moderados en invierno, y un poco más generosos en verano, con pulverización de hojas especialmente en ambientes muy secos.

Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK) a razón de 2 gr. por litro de agua. . De lento crecimiento, pero muy resistente al ataque de insectos y hongos. De aparecer manchas amarillas en las hojas aplicar benlate o sumisclex.



ROSAS (*Rosa chinensis*)

Familia: Rosáceas.

Origen: Hemisferio Norte.

Variedades: **Clases:** Híbridos de té, Polianthas, Floribundas, Trepadoras y Miniaturas a las cuales se va a hacer referencia.

Cuidados: Las rosas en maceta son plantas para estar en el exterior a pleno sol o en interior colocarla bien cerca de una ventana con orientación norte. Florecen a partir de primavera, hasta el otoño. Dado que son plantas inducidas a florecer se consiguen plantas en flor en cualquier época del año. Regarlas con moderación pero no dejar que le falte agua. Fertilizarlas a partir de primavera con fertilizante comercial (NPK + micro elementos a una dosis de 2 gr./lt. de agua.)

Los daños más frecuentes se deben a ataques de pulgones y ácaros que se combaten eficazmente con insecticidas acaricidas comerciales. Cuando se combina alta humedad ambiente con alta temperatura pueden aparecer problemas de hongos (oidio) que se controla con Benomyl.



SCHEFFFLERA (*Schefflera arboricola*)

Familia: Araliaceas.

Origen: Sureste Asiático.

Variedades: "Compacta", de hojas verdes, "Golden Capella", "Trinette", "Gerda" con variegaciones amarillas y "Renate", con foliolos aserrados.

Cuidados: Se utiliza tanto como planta de interior como de exterior. Ubicarla en sitios luminosos, y puede soportar un rato de sol directo. En lugares con calefacción, (alta temperatura y baja humedad), le pueden provocar la caída de las hojas, por lo que hay que pulverizarlas frecuentemente. Regar generosamente cuando el sustrato este seco, evitar tener la tierra siempre húmeda. Abonarla en primavera verano con fertilizantes comerciales NPK 15-15-15 (2gr./lt. de agua) . Es común el ataque de pulgones en las hojas nuevas, que se combaten con Orthene o Diazinon.



SPATHIPHYLLUM (*Spathiphyllum wallisii*)

Familia: Aráceas.

Origen: América Tropical.

Variedades: Las más modernas "Vivaldi", "Mozart", "Chopin", "Daniel".

Cuidados: Se adapta perfectamente a situaciones de poca luz, no exponerla directamente al sol. Presenta atractivas flores blancas que duran varias semanas y cambian de blanco a verde pálido.

Regarla con frecuencia en primavera verano, siempre dejando secar la tierra entre los diferentes riegos y con moderación en invierno, mantenerle el aire húmedo mediante pulverizaciones a las hojas especialmente en verano y en sitios con calefacción. Una deficiencia de agua la planta enseguida la manifiesta en sus hojas con un aspecto de decaimiento y pérdida de color verde intenso por uno opaco.

Las enfermedades más importantes son causadas por un hongo, que produce amarillamiento en las hojas, para lo cual se la riega con fungicidas como Previcur o Ridomil.



SYNGONIUM (*Syngonium podophyllum*)

Familia: Aráceas.

Origen: América Tropical.

Variedades: "Esmerald Sem", "Green Gold", "White Butterfly" y "Lemon Lime" más amarillenta.

Cuidados: Se utiliza tanto como planta de mesa, colgante o trepadora. Colocarla en sitios luminosos sin sol directo, soportan lugares oscuros, aunque estos sitios perjudica la coloración de las hojas. Regar moderadamente en invierno dejando secar el sustrato entre los distintos riegos, y más frecuentemente en verano, mantener un alto grado de humedad en el aire mediante pulverizaciones. Fertilizar en primavera verano con fertilizante comercial NPK (2gr./lt. de agua)



VIOLETA AFRICANA (*Saintpaulia ionantha*)

Familia: Gesneriáceas.

Origen: Bosques tropicales del Este de Africa.

Variedades: "Rococo", "Rhapsody", "Fischer Ballet", "Melodie".

Cuidados: Las violetas florecerán en sitios con buena luz y sol tamizado, les encantan las ventanas con orientación norte. La floración se extiende casi todo el año exceptuando el invierno. Regar moderadamente dejando secar ente los distintos riegos, evitando mojar las hojas. Le gusta los ambientes calidos y húmedos, la temperatura no debería bajar de 15°C, y también evitar corrientes de aire. Es importante la temperatura del agua del riego, que esta sea similar a la del ambiente. Cuando las plantas se hacen demasiado grandes cambiarla de envase utilizando tierra preparada para plantas de interior. Abonarla en primavera con fertilizantes comerciales (NPK 15-15-15 1 gr./lt. de agua).



VIOLETA DE LOS ALPES (*Cyclamen persicum*)

Familia: Primuláceas.

Origen: Oriente Medio, Islas del Egeo y Persia.

Variedades: Clases: Híbridos (F1), Mini cyclamen, Clásicas de flor grande, Tipo Pastel, cada una de ellos con infinitas variedades.

Cuidados: Planta de exterior, aprecia las bajas temperaturas de invierno y prefiere una luz solar filtrada. Florecen desde finales del otoño durante todo el invierno hasta la entrada de la primavera.

Si bien se puede conservar el tubérculo y volverlo a sembrar se recomienda utilizarla como una planta de estación y volver a adquirirlas la próxima temporada.

Regar sobre la tierra, con regularidad, evitar déficit hídricos y encharcamientos. Elimine las hojas marchitas desde la base.

Los problemas más comunes son los causados por hongos tanto a nivel de la corona como de la raíz, que se controlan con Benomyl.



YUCCA (*Yucca elephantipes*)

Familia: Agaváceas.

Origen: Zonas áridas de América Central y Norteamérica.

Variedades: "Aloifolia" y "Gloriosa"

Cuidados: Planta de interior, que también se puede utilizar en exterior, evitando que reciba sol directo. En interiores es una planta muy rustica, su mayor exigencia es la luz, debe situarse en ventanas con orientación norte, pero evitar los rayos directos del sol. Es tolerante a bajas temperaturas, riegos moderados en invierno, más generosos en verano, acompañados de pulverizaciones al follaje. Es conveniente cambiar el envase cada 2 años ya que cuando comienza a crecer sus raíces son muy agresivas. Fertilizar en primavera y en verano con NPK (15-15-15) a una dosis de 2 gr./lt. de agua. Son poco frecuentes los problemas sanitarios.